

IB 1225

Vass5R04s361-365



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1913

0Mtp1913

Date : 9.7 2014
Personne : G
Nb feuille : 4

INRA Colmar IB 1225

IB 1225

Vass5R04s361-365

Vass5R04s366-370

0Mtp1913
IB 1225
Vass5R04s361-365
366-370







Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2012 3731 Observateur :
CodeVar : 0 CodeIntro : 0Mtp1913 NomVar : Cépage non identifié
Nom introduction : IB 1225 Emplacement : Vass5R04s361-365

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr e	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE						
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	4	27/3	2/4	8	
2	4	19/03 27/3	31/3	8	
3	2		30/3	3	
4	4	27/3	31/3	5	
5	3		31/3	2	
Moyenne	17		31/3 +3	26	15

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	31.05 +2	70-80 %	18.07	26.07 0	20.08 +1	

16/05 25.05 29.05
12.07 18.07 26.07 20.08

SUIVI DE MATURITE						
Dates						
IR	19.8-20.2					
Valeur papier PH	29.5/A					

Remarque : pose 3 filets 26.07
Coul N
Sav N
pép Qui

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2012 3731 Observateur :
CodeVar : 0 CodeIntro : 0Mtp1913 NomVar : Cépage non identifié
Nom introduction : IB 1225 Emplacement : Vass5R04s366-370

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr e	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE						
Oiv 459	Degré de résistance Botrytis grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	5	31/3	2/4	8	
2	2		2/4	3 dans 6 filets	
3	(F) 2		31/3	2	
4	3 en formation		5/4	6	
5	2	1 grappe 27/3	30/3	2 dans 6 filets	
Moyenne	14		2/4 +5	21	15

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	31/05 +2		17 07	26.07 0	20.08 +1	

Quasi. nr 29.05 12g. m. p. = 30.

SUIVI DE MATURITE							
Dates	20.08.						
IR	21 - 20,2 ég. 51A						
Valeur papier PH							

Remarque: Se fait ranger pour 3 filets 26.07 + 2 filets 30.07
AJOUTER FILETS
Coul N
Sav N
pép Ovi

Formulaire description 4 / 8 (nouaison-véraison)		Emplacement <i>Vass 5 R 4 n 361-365</i>
Nom variété / introduction <i>IB 1225</i>		Remarques <i>Forte attaque mildiou</i>
Observateur - Date <i>cm 9/8/2018</i>	Code var / intro <i>OMT 1918</i>	

LIMBE						
Code OIV	Descripteur	1	3	5	7	9
065 = 17	Taille du limbe	très petite	<u>petite</u>	moyenne	grande	très grande
067 = 18	Forme du limbe	1-cordiforme	2-cunéiforme	3-pentagon.	<u>4-orbicul.</u>	5-rénif.
068 = 20	Nombre de lobes	1-F. entière	<u>2-trois</u>	3-cinq	4-sept	5- + de sept
069	Couleur face supérieure limbe		<u>vert clair</u>	vert moyen	vert foncé	
070 = 27	Distribution de la pigmentation anthocyannique des nervures principales, face supérieure du limbe	1- nulle	2- seulement au point pétiole	3- jusqu'à 1 ^{ère} bifurc.	4- jusqu'à 2 ^{ème} bifurc.	5- au-delà de la 2 ^{ème} bifurc.
071	Distribution de la pigmentation anthocyannique des nervures principales, face inférieure du limbe	1- nulle	2- seulement au point pétiole	3- jusqu'à 1 ^{ère} bifurc.	4- jusqu'à 2 ^{ème} bifurc.	5- au-delà de la 2 ^{ème} bifurc.
074	Profil du limbe	<u>1-plan</u>	2-en V	3-involuté	4-révoluté	5-tourmenté
073	Ondulation du limbe (entre nervures I ou II)	<u>absente</u>				présente
072	Gaufre du limbe (dépression entre nervures I et II)	<u>absente ou t. fb.</u>	faible	moyenne	forte	très forte
075 = 19	Cloûre de la face sup. du limbe (entre nerv. dernier ordre)	<u>nulle à t. fb.</u>	faible	moyenne	forte	très forte
084 = 28	Densité p. couchés entre nerv. face inf.	nulle à t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
085	Densité p. dressés entre nerv. face inf.	nulle à t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
086	Densité p. couchés des nerv. face inf.	nulle à t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
087 = 29	Densité p. dressés des nerv. face inf.	nulle à t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
088	Villosité couchée nerv. principales face sup	<u>absente</u>				présente
089	Villosité dressée nerv. principales face sup	<u>absente</u>				présente
000-44	Densité p. couchés limbe face sup.	nulle à t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
000-45	Densité p. dressés limbe face sup.	<u>nulle à t. fb.</u>	faible	moyenne	forte	très forte

PETIOLE						
090	Densité poils couchés sur le pétiole	nulle à t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
091	Densité poils dressés sur le pétiole	<u>nulle à t. fb.</u>	faible	moyenne	forte	très forte
093 = 30	Longueur pétiole p/r nervure médiane	<u>plus court</u>	légér. plus court	égal	légér. plus long	plus long
000-06	Couleur du pétiole	1 - coloré	2 - partiel. coloré	<u>3 - vert</u>		

SINUS PETIOLAIRE (EGALEMENT OBSERVABLE SUR FEUILLES D'HERBIER, FORMULAIRE N° 7)						
079 = (23)	Degré d'ouverture/chevauchement du sinus pétiole	très ouvert	ouvert	<u>fermé</u>	chevauchant	très chev.
	<i>+ocvv</i>	<i>très larg. ouvert</i>	<i>demi-ouvert</i>	<i>peu ouvert</i>	<i>légér. chev.</i>	<i>très fort. chev</i>
080	Forme de la base du sinus pétiole	1- en U	2- en accolade	<u>3- en V</u>		
081-1	Dent dans la sinus pétiole	<u>absents</u>				présents
081-2	Base du sinus pétiole limité par la nervure	<u>1- non limité</u>	2- sur un côté	3- sur les deux côtés		

SINUS LATÉRAUX SUPÉRIEURS (EGALEMENT OBSERVABLE SUR FEUILLES D'HERBIER, FORMULAIRE N° 7)						
082 = (22)	Degré d'ouverture/chevauchement des sinus latéraux supérieurs	<u>1- ouverts</u>	2- fermés	3- légèrement chevauchants	4- très chevauchants	5- absence de sinus
094 = 21	Profondeur des sinus latéraux supérieurs	absence ou très peu profond	<u>peu profond</u>	moyens	profonds	très profonds
083-1	Forme de la base des sinus latéraux supérieurs	<u>1- en U</u>	2- en accolade	3- en V		
083-2	Dent dans les sinus latéraux supérieurs	<u>absentes</u>				présents

DENTS (EGALEMENT OBSERVABLE SUR FEUILLES D'HERBIER, FORMULAIRE N° 7)						
076 = 26	Forme des dents	1- à deux côtés concaves	<u>2- à deux côtés rectilignes</u>	3- à deux côtés convexes	4- un c. concaves, un c. convexes	5- mélange notation 2 et notation 3
077 = ((24))	Taille des dents par rapport à la taille du limbe	très petites	<u>petites</u>	<u>moyennes</u>	grandes	très grandes
078 = 25	Longueur des dents par rapport à leur largeur	très courtes	<u>courtes</u>	moyennes	longues	très longues

AUTRE CARACTERE OBSERVABLE A CETTE PERIODE						
Oiv 501	Taux de nouaison (7 à 14 j. après flor.)	très faible (<10%)	faible (11-30%)	moyen (31-50%)	élevé (51-70%)	<u>très élevé (>80%)</u>
303 = 31	Epoque de début de véraison	très précoce	précoce	<u>moyenne</u>	tardive	très tardive

INRA Vassal	Virus ENR	Mildiou <i>F-7, I=7</i>	Esca	Chlorose
Codes OIV 2009 (= OCVV 2013)	Virus CN	Oïdium	Eutypiose	<u>Carence Mg</u>
Codes 000-internes	Autre	Botrytis	Excrosiose	Autre